



PROVA AMB, AMRIGS, ACM e AMMS 2020

RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: PNEUMOLOGIA/PEDIATRIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem a Prova AMB, AMRIGS, ACM e AMMS.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 30 (trinta) questões.
4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente preenchida. Caso deixe o local de aplicação antes de transcorridas 2 (duas) horas de prova, o candidato deverá entregar também o caderno de questões.
8. As provas padrão serão disponibilizadas nos sites da AMRIGS, ACM, AMMS e Fundatec.
9. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
10. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
11. Os gabaritos preliminares da prova serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!



QUESTÃO 01 – São fatores de risco para a suspeita de germes resistentes à terapia inicial empírica para a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), EXCETO:

- A) Hemoptise maciça.
- B) Hemodiálise crônica nos 30 dias prévios.
- C) Hospitalização por mais de dois dias há seis meses.
- D) Insuficiência cardíaca congestiva.

QUESTÃO 02 – São germes mais comuns associados à PAC em paciente com alcoolismo, EXCETO:

- A) *Klebsiella pneumoniae*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Mycobacterium tuberculosis*.
- D) *Acinetobacter spp.*

QUESTÃO 03 – Na patogenia dos abscessos pulmonares primários, os germes anaeróbios parecem ter uma participação significativa. Com esse conhecimento, qual antibiótico NÃO deve ser usado como tratamento inicial empírico único?

- A) Metronidazol.
- B) Clindamicina.
- C) Moxifloxacino.
- D) Ampicilina/Sulbactam.

QUESTÃO 04 – O uso crônico de tabaco aumenta em 10 vezes o risco para desenvolver câncer de pulmão. Qual a resposta mais correta relativa a outros fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão?

- A) Ingestão baixa de frutas e vegetais.
- B) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- C) Todas as alternativas acima.
- D) Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 05 – Nos últimos anos, em alguns países desenvolvidos, o adenocarcinoma passou a ser o mais frequente tipo histológico encontrado nos pacientes com câncer de pulmão, enquanto os tipos histológicos epidermoide (escamoso) e o de pequenas células estão em declínio. O motivo mais provável associado a essa afirmação se deve:

- A) Ao uso frequente de cigarros eletrônicos.
- B) À diminuição do uso de tabaco.
- C) Ao incremento no uso de cannabis fumada (maconha).
- D) Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 06 – Homem de 60 anos em boas condições clínicas e sem comorbidades significativas, tabagista, com carga tabágica de 60 maços-ano, traz uma tomografia computadorizada de tórax mostrando uma lesão nodular sólida e única de 10 cm de diâmetro, no lobo superior esquerdo, não calcificada, com bordos espiculados, com alta probabilidade radiológica (>60%) de neoplasia maligna pulmonar. Uma PET-CT (Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons) foi realizada mostrando captação significativa do radiofármaco sugerindo fortemente neoplasia maligna de pulmão. Frente a essa situação, seu próximo passo seria:

- A) Biópsia da lesão.
- B) Quimioterapia e radioterapia.
- C) Imunoterapia oncológica.
- D) Repetir TC em três meses.

QUESTÃO 07 – Paciente de 20 anos de idade e portador de asma brônquica vem à consulta médica referindo tosse seca diurna e despertares noturnos frequentes por falta de ar, caracterizando uma doença não controlada. Dentre os fatores abaixo, qual seria o motivo mais comum para o descontrole da doença?

- A) Exposição a alérgenos domiciliares.
- B) Rinossinusite não controlada.
- C) Uso de medicamentos que pioram a asma.
- D) Não adesão ou baixa adesão ao tratamento para asma.

QUESTÃO 08 – A DPOC é definida como uma doença caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível. São tratamentos recomendados em algum momento do desenvolvimento da doença:

- I. Cessação do tabagismo, reabilitação pulmonar, farmacoterapia com broncodilatadores.
- II. Métodos para redução de volume pulmonar – cirúrgica ou endoscópica.
- III. Uso de azitromicina diária em exacerbadores frequentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Pacientes com Lesão Pulmonar Aguda/Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (LPA/SDRA) geralmente estão em ventilação mecânica invasiva e protetora dos pulmões usando baixos volumes correntes (6 mL/kg de peso corporal ideal) associado a níveis altos de PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final). Essa modalidade de ventilação mecânica é nomeada protetora por:

- I. Prevenir a superdistensão alveolar.
- II. Diminuir o colapso alveolar.
- III. Diminuir mortalidade em pacientes com LPA.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Em relação à função pulmonar dos pacientes transplantados de pulmão, é correto afirmar que:

- A) Após transplante bilateral, a função pulmonar geralmente não é normal.
- B) Após transplante unilateral, a função pulmonar geralmente é normal.
- C) O teste de exercício geralmente mostra alguma disfunção ao trabalho máximo de exercício.
- D) A maioria dos pacientes permanecem com dificuldade respiratória às lidas diárias.

QUESTÃO 11 – Em relação à Apneia Central do Sono, analise as assertivas a seguir:

- I. É menos comum que a Apneia Obstrutiva do Sono.
- II. É caracterizada por períodos alternados de hiperventilação e apneias.
- III. É um fator de risco independente para o desenvolvimento de Fibrilação Atrial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Em relação a Doença Intersticial Pulmonar (DIP), é INCORRETO afirmar que:

- A) É uma manifestação comum de muitas doenças do tecido conjuntivo.
- B) É caracterizada pelo remodelamento do espaço intersticial sem envolvimento alveolar e endotelial.
- C) Dispneia progressiva é a queixa mais comum.
- D) Várias medicações anti-inflamatórias usadas para tratamento das DPI (azatioprina, metotrexate) estão também associadas com o desenvolvimento da doença.

QUESTÃO 13 – Em relação a pacientes com bronquiectasias, analise as assertivas a seguir:

- I. O envolvimento maior dos lobos superiores é mais comum na Fibrose Cística.
- II. O maior envolvimento dos lobos inferiores é mais característico de aspirações do conteúdo gástrico recorrentes.
- III. O envolvimento predominante das vias aéreas centrais é característico de Aspergilose Broncopulmonar Alérgica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 14 – São características das Doenças Pulmonares Ocupacionais:

- I. Exposição a resíduos orgânicos ou inorgânicos apresentam padrão funcional restritivo com diminuição da capacidade de difusão do CO.
- II. Gases solúveis em água, como amônia, têm a tendência de produzir respostas broncoconstritoras.
- III. A exposição a asbestos pode produzir fibrose pulmonar, câncer do trato respiratório e mesotelioma pleural e peritoneal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 15 – São características da Pneumonia por Hipersensibilidade (PH) pode ser desencadeado por:

- I. Pode ser desencadeada por antígenos derivados de bactérias.
- II. Fibrócitos derivados da medula óssea podem contribuir para a inflamação e fibrose do pulmão.
- III. Como alternativa de tratamento, os glucocorticoides podem acelerar a resolução dos sintomas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Em relação às complicações da meningite bacteriana na criança, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas assertivas abaixo.

- () Hipertensão intracraniana.
- () Trombose vascular cerebral.
- () Alterações da motilidade ocular.
- () Empiema subdural.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – F.
- B) F – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) V – V – V – V.

QUESTÃO 17 – Analise as assertivas abaixo em relação às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente:

- I. Determina que o Código de Ética Médica tenha especial preocupação com o sigilo de crianças e adolescentes, respeitando a capacidade de compreensão do paciente pediátrico.
- II. Determina que, a partir dos 13 anos, quando ocorrer conflito entre os interesses do adolescente e dos pais, deverá prevalecer a vontade do adolescente.
- III. Determina o direito à autonomia de crianças e adolescentes.
- IV. Determina a proteção integral da criança e do adolescente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e IV.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18 – Menino de 4 anos é levado ao Pronto Atendimento Pediátrico por edema e eritema palpebral à direita. Enxerga bem, movimentação sem problemas o globo ocular e não tem proptose. A mãe refere que está há 10 dias com sintomas gripais, sem tratamento. A impressão diagnóstica é de:

- A) Dermatite alérgica.
- B) Celulite pré-septal.
- C) Celulite pós-septal.
- D) Abscesso orbitário.

QUESTÃO 19 – Considerando a Doença de Kawasaki, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A sua etiologia é desconhecida mas tem terapêutica estabelecida.
- () A presença de febre é um critério obrigatório.
- () O exantema é polimórfico e inespecífico.
- () O tratamento com doses anti-inflamatórias de ácido acetilsalicílico deve ser prescrito durante 30 dias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F.
- B) F – F – V – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – F – F – V.

QUESTÃO 20 – Analise as assertivas a seguir tendo como referência o diagnóstico de SEPSE:

- I. As idades que envolvem os extremos da vida são as de maior incidência.
- II. A presença de febre é um critério obrigatório para o diagnóstico.
- III. A faixa etária é um importante fator para a escolha do tratamento na ausência de foco infeccioso primário.
- IV. As respostas endócrinas e metabólicas decorrentes da liberação de citocinas são as responsáveis pelas manifestações clínicas e gravidade dos casos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa correta, considerando a hipertensão arterial em crianças e adolescentes.

- A) A criança e o adolescente são considerados normotensos se a PA estiver abaixo do percentil 90, com base na idade, sexo e altura.
- B) Nas crianças e adolescentes, a obesidade e as dislipidemias têm reflexos significativamente inferiores na pressão arterial, quando comparados aos adultos.
- C) A hipertensão arterial que se manifesta no período neonatal raramente se deve a uma doença identificável.
- D) Considerando-se o contexto epidemiológico e importância da hipertensão na infância, as diretrizes atuais recomendam a medida da pressão arterial anualmente, em todas as crianças a partir de 1 ano de vida.

QUESTÃO 22 – Qual é a alteração urológica mais frequentemente associada à infecção urinária na infância?

- A) Refluxo vesicoureteral.
- B) Válvula de uretra posterior.
- C) Rim único.
- D) Divertículo de bexiga.

QUESTÃO 23 – Em relação ao crescimento na adolescência, analise as assertivas abaixo:

- I. O crescimento na adolescência é desproporcional, iniciando-se, primeiramente, pelas extremidades distais.
- II. As meninas, além de iniciarem a puberdade mais cedo, apresentam um pico de velocidade de crescimento mais precocemente que os meninos, entre os estádios 2 e 3 de Tanner.
- III. Durante a puberdade, em ambos os sexos, os esteroides sexuais, principalmente os estrógenos, são essenciais para acelerar o crescimento por meio da ação em receptores específicos da placa epifisária, promovendo crescimento e mantendo abertas as epífises.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 24 – O eritema tóxico neonatal é uma afecção do recém-nascido que se inicia _____ de vida, podendo acometer todo o tegumento, _____ regiões palmares e plantares, e _____ tratamento específico.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) após a primeira semana – não poupando – não requer
- B) entre 24-72 horas – não poupando – requer
- C) após a primeira semana – poupando – requer
- D) entre 24-72 horas – poupando – não requer

QUESTÃO 25 – São características gerais da Síndrome de Münchhausen por procuração:

- I. Queixas constantes de sinais e sintomas de doenças, de várias localizações, associadas com patologias habituais, porém, sem resposta aos tratamentos.
- II. Busca de atendimento médico frequente, por parte do agressor, por queixas de sintomas fixos e sem resposta aos tratamentos convencionais, ou com sintomas variados e procura de consultas em especialistas de diversas áreas, sem obtenção de melhora.
- III. Da parte da criança, a vítima, há uma colagem no discurso do agressor, muitas vezes repetindo com as mesmas palavras a queixa de ter sintomas dos quais não sabe nem o significado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 26 – São critérios necessários para o diagnóstico de PICA (alimentação de substâncias não nutritivas e não alimentares):

- I. Ocorrer a alimentação de substâncias não nutritivas e não alimentares persistente durante um período de, pelo menos, um mês.
- II. Presença de comportamento alimentar inadequado para o nível de desenvolvimento, sendo sugerida uma idade mínima de 2 anos.
- III. Associação com deficiência dos micronutrientes ferro e zinco.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Em relação às complicações da caxumba, são afirmações corretas, EXCETO:

- A) A orquite é um achado mais frequente em adolescentes pós-puberdade quando comparado aos pré-púberes.
- B) Na maior parte dos casos, a orquite é bilateral.
- C) Pode ocorrer atrofia dos testículos, mas a esterilidade é rara mesmo com o envolvimento bilateral.
- D) A ooforite é incomum em adolescentes pós-púberes, mas pode causar dor severa e pode ser confundida com apendicite.

QUESTÃO 28 – Em relação à dengue na criança, analise as seguintes assertivas:

- I. Pode manifestar-se como síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos, sem sinais de localização.
- II. A prova do laço positiva na infância representa sempre um sinal de dengue grave, indicando necessidade de cuidados intensivos.
- III. Num segundo episódio de dengue, o risco de evoluir para uma forma mais grave da doença é maior.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Em relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que:

- A) Em recém-nascidos sem fatores de risco, a primeira dose da vacina deve ser aplicada aos dois meses, associada à vacina pentavalente.
- B) Crianças com peso de nascimento inferior a 2.000g só devem receber a vacina após atingir 2 Kg.
- C) Crianças maiores de dois anos e adolescentes que não foram vacinados contra hepatite B devem receber vacina em dose única para garantir a indução de imunidade em longo prazo.
- D) Recém-nascidos de mães portadoras de hepatite B devem receber imunoglobulina humana específica (IGHB) e a primeira dose da vacina hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida.

QUESTÃO 30 – Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

- I. Lactentes amamentados no peito apresentam incidência de anemia ferropriva menor em relação aos bebês alimentados com leite de vaca.

PORQUE

- II. No leite materno, a maior proporção do ferro está ligada à fração caseína (65-81%), e, no leite de vaca, à fração soro (61-73%).

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.