## PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA 2026- ACESSO DIRETO- GABARITO MANHÃ

| 1  | Aciclovir VO ou Valaciclovir VO  |
|----|--|
| 2  | esclerose subcondral ou osteófitos ou cisto subcondral ou diminuição do espaço           |
|    | articular ou deformidade em varo   |
| 3  | angioplastia primária, cateterismo cardíaco  |
| 4  | Doença de Wilson   |
| 5  | cura da infecção pelo vírus da hepatite B, cicatriz sorológica para hepatite B, hepatite |
|    | B resolvida  |
| 6  | dexametasona ou metilprednisolona  |
| 7  | carbamazepina ou oxcarbazepina   |
| 8  | glomeruloparia (ou glomerulonefrite) membranosa  |
| 9  | Staphylococcus aureus  |
| 10 | sarcoidose   |
|    |  |
| 11 | medial   |
| 12 | hemorragia recente e sinonímia. O componente agudo da hemorragia é fundamental           |
|    | para a pontuação da resposta. Somente hematoma subdural não pontua.                      |
| 13 | doença diverticular de colons ou diverticulose de colons. Diverticulite não pontua       |
| 14 | terceiro grau  |
| 15 | megacolon congênito (doença de Hirschprung)  |
| 16 | II ou IIb  |
| 17 | empiema pleural  |
| 18 | musculatura, panturrilha ou grupos musculares.   |
| 19 | ultrassonografia vascular com Doppler ou sinonímia                                       |
| 20 | cateterismo vesical de alívio  |
|    |  |
| 21 | redução da parafimose ou redução   |
| 22 | Streptococcus pyogenes, estretptococo beta hemolítico do grupo A (sinonímia),            |
|    | S.pyogenes   |
| 23 | aspiração, broncoaspiração, distúrbio de deglutição.                                     |
| 24 | fosfato de oseltamivir. Outros medicamentos não pontuam                                  |
| 25 | estatura normal  |
| 26 | diazepan (endovenoso ou via retal) ou midazolan (endovenoso ou inalatório ou             |
|    | intramuscular)   |
| 27 | glomérulo  |
| 28 | mastoidite aguda   |
|    |  |

| 29 | eritema tóxico, eritema tóxico neonatal, eritema neonatal                           |
|----|---|
| 30 | verificar ou corrigir a técnica de ventilação                                       |
|    |   |
| 31 | insuficiência istmo cervical ou incompetência istmocervical                         |
| 32 | tratamento cirúrgico, cirurgia ou sinonímia. Qualquer conduta não cirúrgica isolada |
|    | não pontua.   |
| 33 | pode manter o contraceptivo oral combinado, manter a prescrição                     |
| 34 | cervicite   |
| 35 | terapia estrogênica isolada e sinonímia   |
| 36 | realizar 2g de sulfato de magnésio intravenoso (metade da dose de ataque inicial).  |
|    | Não pontua se não estiver referido 2g   |
| 37 | repetir ultrassonografia em 6 meses   |
| 38 | repetir sorologia. Teste de gravidez não pontua.                                    |
| 39 | repetir teste DNA-HPV em 1 ano.   |
| 40 | occipito esquerda transversa  |
|    |   |
| 41 | febre amarela   |
| 42 | mortalidade neonatal  |
| 43 | projeto terapêutico singular ou plano terapêutico singular                          |
| 44 | equipe de referência ou equipe responsável  |
| 45 | impostos ou impostos gerais   |
| 46 | 50% ou metade ou ½ ou paritária   |
| 47 | fase I ou fase IA   |
| 48 | equidade  |
| 49 | patch teste ou teste epicutâneo ou teste de contato ou teste alérgico de contato    |
| 50 | silicose, sílica ou pneumopatia crônica por sílica.                                 |